ALADIN - Kollaboration

R. Bassini[1], M. Begemann-Blaich[2], S. Fritz[2], S.J. Gaff[3], C. Gross[2], G. Immé[4], I. Iori[1], U. Kleinevoss[2], G.J. Kunde[3], W.D. Kunze[2], U. Lynen[2], V. Maddalena[4], M. Mahi[2], T. Möhlenkamp[5], A. Moroni[1], W.F.J. Müller[2], C. Nociforo[4], B. Ocker[6], T. Odeh[2], F. Petruzzelli[1], J. Pochodzalla[2,7], G. Raciti[4], G. Riccobene[4], F.P. Romano[4], Th. Rubehn[2,8], A. Saija[4], M. Schnittker[2], A. Schüttauf[6], C. Schwarz[2], W. Seidel[5], V. Serfling[2], C. Sfienti[4], W. Trautmann[2], A. Trzcinski[9], G. Verde[4], A. Wörner[2], Hongfei Xi[2,3] und B. Zwieglinski[9]

[1]Dipartimento di Fisica, Università di Milano and I.N.F.N., Milano
[2]Gesellschaft für Schwerionenforschung, Darmstadt
[3]NSCL, Michigan State University, East Lansing
[4]Dipartimento di Fisica dell' Università and I.N.F.N., Catania
[5]Forschungszentrum Rossendorf, Dresden
[6]Institut für Kernphysik, Universität Frankfurt, Frankfurt
[7]Max Planck Institut für Kernphysik, Heidelberg
[8]Nuclear Science Division, LBNL, Berkeley
[9]Soltan Institute for Nuclear Studies, Warsaw